Хилак® форте (Hylak® forte) - инструкция

Латинское название
Hylak® forte

АТХ
A07FA Противодиарейные микроорганизмы

Фармакологическая группа

Противодиарейное средство [Средства, нормализующие микрофлору кишечника]

Нозологическая классификация (МКБ-10)

A02 Другие сальмонеллезные инфекции
A02.0 Сальмонеллезный энтерит
K29.6.0* Гастрит анацидный
K30 Диспепсия
K52 Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты
K59.0 Запор
K59.1 Функциональная диарея
K63.8.0* Дисбактериоз
K76.9 Болезнь печени неуточненная
K82.9 Болезнь желчного пузыря неуточненная
L30.9 Дерматит неуточненный
L50 Крапивница
R14 Метеоризм и родственные состояния
Y40.9 Неблагоприятные реакции при терапевтическом применении системных антибиотиков неуточненных
Z51.0 Курс радиотерапии
Z58 Проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды

Состав

Капли для приема внутрь	**100 мл**
активные вещества:	
беззародышевые водные субстраты продуктов обмена веществ:	
Escherichia coli DSM 4087	24,9481 г
Streptococcus faecalis DSM 4086	12,4741 г
Lactobacillus acidophilus DSM 4149	12,4741 г
Lactobacillus helveticus DSM 4183	49,896 г
вспомогательные вещества: натрия фосфат гептагидрат; калия фосфат; молочная кислота; фосфорная кислота концентрированная; калия сорбат; лимонной кислоты моногидрат	

Описание лекарственной формы
Прозрачный от светло-желтого до желто-коричневого цвета раствор с характерным кисловатым запахом.

Фармакологическое действие
Фармакологическое действие - нормализующее микрофлору кишечника.

Фармакодинамика

Хилак форте регулирует равновесие кишечной микрофлоры и нормализует ее состав. Благодаря содержанию в составе Хилака форте продуктов обмена нормальной микрофлоры, препарат способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника биологическим путем и позволяет сохранить физиологические и биологические функции слизистой оболочки кишечника.

Входящие в состав Хилака форте биосинтетическая молочная кислота и ее буферные соли восстанавливают нормальное значение кислотности в ЖКТ независимо от того, страдает ли пациент от повышенной или пониженной кислотности.

На фоне ускорения развития нормальных симбионтов кишечника под действием Хилака форте нормализуется естественный синтез витаминов группы В и К.

Содержащиеся в препарате Хилак форте короткоцепочечные летучие жирные кислоты обеспечивают восстановление поврежденной микрофлоры кишечника при инфекционных заболеваниях ЖКТ, стимулируют регенерацию эпителиальных клеток кишечной стенки, восстанавливают нарушенный водно-электролитный баланс в просвете кишки.

Имеются данные о том, что Хилак форте усиливает защитные функции организма благодаря стимуляции иммунного ответа.

При применении Хилака форте отмечается ускорение выведения сальмонелл у грудных детей после сальмонеллезного энтерита, что обусловлено стимуляцией роста ацидофильной анаэробной кишечной флоры и ее последующим антагонистическим воздействием на сальмонеллы.

Показания препарата Хилак® форте

нарушение физиологической флоры тонкого и толстого кишечника (во время и после лечения антибиотиками или сульфаниламидами, лучевой терапии);

синдром недостаточности пищеварения, диспепсия;

диарея, метеоризм, запор;

гастроэнтерит, колит, синдром старческого кишечника (хронический атрофический гастроэнтерит);

расстройства со стороны ЖКТ, вызванные сменой климата;

гипо- и анацидные состояния;

энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени;

аллергические кожные заболевания (крапивница, эндогенно обусловленная хроническая экзема);

сальмонеллез в стадии реконвалесценции (в т.ч. детей грудного возраста).

Противопоказания

гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Хилак форте в период беременности и лактации считается безопасным. Однако решение о назначении препарата принимает лечащий врач.

Побочные действия

Хилак форте хорошо переносится больными любого возраста.

Побочные действия до настоящего времени не наблюдались.

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница); запор, диарея.

Взаимодействие

Под влиянием антацидных препаратов возможна нейтрализация молочной кислоты, входящей в состав препарата Хилак форте.

Способ применения и дозы

Внутрь, до или во время приема пищи, разбавляя небольшим количеством жидкости (исключая молоко), 3 раза в сутки. Взрослым — по 40–60 капель на 1 прием, детям — по 20–40 капель, младенцам — по 15–30 капель. После улучшения состояния суточная доза может быть уменьшена наполовину.

Передозировка

Никаких специальных мероприятий за исключением обычного медицинского наблюдения не требуется.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием данного препарата с молоком и молочными продуктами.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь. По 30 или 100 мл препарата во флаконах темного стекла, укупоренных пробками-капельницами и завинчивающихся пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия. По 1 фл. в картонной пачке.

Производитель

«Меркле ГмбХ», Людвиг-Мерклештрассе, 3, D-89143, Блаубойрен, Германия.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «ратиофарм РУС». 105064, Москва, ул. Земляной вал, 9 (ДЦ СИТИДЕЛ).

Тел.: (495) 232-12-47; факс (495) 232-13-69.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Условия хранения препарата Хилак® форте

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Хилак® форте

4 года. После вскрытия флакона — 6 недель.