

Сироп Линкас — инструкция по применению

Клинико-фармакологическая группа

Фитопрепарат с отхаркивающим действием

Форма выпуска, состав и упаковка

Сироп коричневого цвета с характерным запахом.

	10 мл
сухой экстракт листьев адхатоды сосудистой	600 мг
сухой экстракт корней солодки голой	75 мг
сухой экстракт плодов и корней перца длинного	100 мг
сухой экстракт цветков фиалки душистой	25 мг
сухой экстракт листьев иссопа лекарственного	50 мг
сухой экстракт корней и корневищ альпинии галанга	50 мг
сухой экстракт плодов кордии широколистной	100 мг
сухой экстракт цветков алтея лекарственного	100 мг
сухой экстракт плодов зизифуса настоящего	100 мг
сухой экстракт листьев и цветков оносмы прицветковой	100 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, лимонная кислота безводная, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода очищенная.

90 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологическое действие

Комбинированный растительный препарат. Снижает интенсивность и увеличивает продуктивность кашля, оказывает отхаркивающее, муколитическое и противовоспалительное действие.

Адхатода сосудистая оказывает противокашлевое, бронхолитическое, отхаркивающее и спазмолитическое действие.

Корень солодки гладкой содержит глицирризин и пенообразующие вещества - сапонины, которые способствуют повышению секреторной функции эпителия дыхательных путей, изменению поверхностно-активных свойств легочного сурфактанта, стимулируют движение ресничек эпителия, разжижают мокроту и облегчают ее отхождение. Оказывает угнетающее влияние на экссудативную и пролиферативную фазу воспаления. Обладает антиаллергическими свойствами.

Перец длинный обладает антибактериальными, противоаллергическими свойствами. Оказывает противокашлевое и общетонизирующее действие.

Фиалка душистая оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, успокаивающее, противомикробное и спазмолитическое действие.

Иссоп обыкновенный содержит диосмин, который оказывает антисептическое, противовоспалительное, анальгезирующее и противокашлевое действие.

Калган большой оказывает бактерицидное действие, обладает противовоспалительными и отхаркивающими свойствами.

Алтей обыкновенный оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Зизифус обыкновенный оказывает отхаркивающее действие, уменьшает боли в горле, обладает седативными и антибактериальными свойствами.

Фармакокинетика

Действие препарата Линакс является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Дозировка

Детям в возрасте от 6 мес до 3 лет назначают по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) 3 раза/сут; **детям в возрасте от 3 до 8 лет** - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза/сут; **детям и подросткам в возрасте от 8 до 18 лет** - по 1 чайной ложке 4 раза/сут.

Взрослым препарат назначают по 2 чайные ложки сиропа 3-4 раза/сут.

Средняя продолжительность курса лечения - 5-7 дней и более в зависимости от клинической картины заболевания.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Линкас не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Линкас не предоставлены.

Беременность и лактация

В связи с отсутствием до настоящего времени адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарат не рекомендуют назначать при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Редко: аллергические реакции.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года; не использовать после даты, указанной на упаковке.

Показания

— симптоматическая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (на фоне ОРВИ, гриппа, трахеита, бронхита, трахеобронхита, пневмонии, бронхита курильщика и других воспалительных заболеваний дыхательных путей).

Противопоказания

- детский возраст до 6 мес;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью применяют препарат при сахарном диабете.

Особые указания

В состав сиропа входит сахароза (70%), что необходимо учитывать при назначении препарата больным сахарным диабетом и пациентам, соблюдающим гипокалорийную диету.

Не рекомендуется одновременный прием Линкаса с противокашлевыми лекарственными средствами, а также с препаратами, уменьшающими образование мокроты.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте от 6 мес до 3 лет назначают по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) 3 раза/сут; **детям в возрасте от 3 до 8 лет** - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза/сут; **детям и подросткам в возрасте от 8 до 18 лет** - по 1 чайной ложке 4 раза/сут.

Препарат противопоказан детям до 6 мес.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.